

FICHA TÉCNICA

CAPTIP 80 WG

Registro No: RSCO-FUNG-0306-X0075-420-080

DESCRIPCIÓN

Fungicida altamente compatible en mezcla que interfiere en el proceso de respiración del hongo, inhibiendo la germinación de las esporas y dificultando el desarrollo micelial.

MODO DE ACCIÓN

Fungicida de contacto.

FORMA DE PREPARACIÓN

Para abrir el envase, solo corte la bolsa y utilice. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separada prepare una pre-mezcla con poca agua y la dosis a emplear de **CAPTIP 80 WG**. Una vez que los gránulos se diluyan por completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice de 700 litros de agua por hectárea, de tal forma que se logre una cobertura uniforme en el follaje. Use el equipo de protección como lo indica la sección de **"Precauciones y Advertencias de Uso"** de la etiqueta.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Su formulación favorece la retención foliar del ingrediente activo y otorga mayor facilidad de manejo. Al actuar en diferentes etapas del metabolismo del hongo, impide que los patógenos desarrollen resistencia.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Captan

GRUPO QUÍMICO:

Ftalimida

USO AGRONÓMICO:

Fungicida con actividad multi-sitios, preventivo y curativo ampliamente utilizado en frutas y otros cultivos.

FORMULACIÓN:

Gránulos dispersables en agua (WG)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
INGREDIENTE ACTIVO:	
Captan:	
N-(triclorometiltio)ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida.....	80.0
(Equivalente a 800 g de i.a./kg)	
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersante, humectante, estabilizador, espesante y carga.....	20.0
TOTAL.....	100.0

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Aplicación foliar en cultivos de: Pepino, calabaza, calabacita, melón y sandía

DOSIS

650-750 L de agua / ha a 2.0 – 3.0 kg/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

Pedro Moreno #1677,
Piso 6 Oficina 10-13,
Col. Americana, Guadalajara,
Jalisco, C.P. 44160.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg / ha	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
Pepino Calabaza Calabacita Melón Sandía (SL)	Mildiu de las cucurbitáceas	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2.0 – 3.0	Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 650-750 L de agua / ha.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 horas.

() Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso ni con vientos mayores de 15 km/h, o cuando esté lluvia próxima. No mezclar con productos alcalinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Usar equipo de protección personal en buen estado para su manipulación. Seguir las instrucciones para una mezcla y aplicación adecuadas.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: si es inhalado, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Administre oxígeno si el paciente tiene dificultades para respirar. En caso de contacto con los ojos: enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. En caso de ingestión: si la persona está consciente y alerta puede inducir el vomito, si esta inconsciente no administre nada por la boca y busque inmediata atención médica.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Por vía oral: náuseas, vómito y diarrea; Por vía dermal: enrojecimiento e hinchazón de las zonas expuestas; Inhalatoria: lagrimeo, dolor de cabeza y visión borrosa.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: no hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)."

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.