

FICHA TÉCNICA

MACROMAIZE

Registro No: RSCO-MEZC-HEDE-1215-X0006-064-35.28

DESCRIPCIÓN

Combina Atrazina y Dicamba para control prolongado de malezas mediante interrupción de la fotosíntesis y crecimiento celular.

MODO DE ACCIÓN

Herbicida residual y de contacto.

FORMA DE PREPARACIÓN

Abra el envase de **MACROMAIZE** y agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque. Adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Control prolongado que permite menor frecuencia de aplicaciones. Seguro para el medio ambiente cuando se usa conforme a las recomendaciones.

CULTIVOS RECOMENDADOS

El producto es recomendado para uso en cultivos de maíz, sorgo y caña de azúcar.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Sal potásica de dicamba +Atrazina

GRUPO QUÍMICO:

Ácido benzoico y Triazinas

USO AGRONÓMICO:

Herbicida efectivo en el manejo preventivo de malezas de hoja ancha.

FORMULACIÓN:

Suspensión concentrada (SC)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % en Peso

Ingrediente Activo:

Sal potásica de dicamba: Sal potásica del Ácido 3,6-dicloro-o-anísico.....13.42
(Con un contenido del 83.5% de Ácido 3,6-dicloro-o-anísico equivalente a 132 g de Ácido 3,6-dicloro-o-anísico /L a 20°C)

Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil -1,3,5-triazina-2,4-diamina.....21.86
(Equivalente a 252 g de Atrazina/L a 20°C)

Ingredientes Inertes:

Solvente, Anticongelante, Dispersante, Adherente y Antiespumante.....64.72

TOTAL.....100.00

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

DOSIS: 2.0 – 3.0 L/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Maíz Sorgo Caña de azúcar (SL)	Quelite bleado (<i>Amaranthus hybridus</i>) Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>) Trebol blanco (<i>Trifolium repens</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	2.0– 3.0 L/ ha	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 230 – 330 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas.

() **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cerca de cuerpos de agua o durante condiciones meteorológicas extremas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Seguir las instrucciones de mezcla y aplicación detalladamente para evitar daños a cultivos no objetivo.

TRATAMIENTO MÉDICO: No existe un antídoto específico. El tratamiento debe dirigirse al control de síntomas y condición clínica. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón por 15-20 minutos y quitar ropa contaminada. En caso de contacto con los ojos, lavar continuamente por 15-20 minutos con agua limpia. En caso de ingestión, si la persona está consciente y alerta, inducir el vómito y realizar lavado gástrico; si está inconsciente, no administrar nada por la boca y buscar atención médica inmediata. En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada a un lugar ventilado y administrar oxígeno si tiene dificultades para respirar.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número 800 000 2869 (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES) Y ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES ACUÁTICOS (PECES).

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.