

FICHA TÉCNICA

METNATE

Registro No: RSCO-FUNG-0369-X0347-417-70.0

DESCRIPCIÓN

Fungicida efectivo contra una amplia gama de enfermedades fúngicas, promoviendo la salud y la longevidad de los cultivos tratados.

MODO DE ACCIÓN

Fungicida sistémico.

FORMA DE PREPARACIÓN

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **METNATE** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Su modo de acción dual permite usarlo tanto en tratamientos preventivos como curativos, ofreciendo una protección integral contra enfermedades.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Tiofanato de metilo

GRUPO QUÍMICO:

Benzimidazol

USO AGRONÓMICO:

Fungicida ideal para el manejo integrado de enfermedades en una variedad de cultivos. incluyendo viñedos y hortalizas.

FORMULACIÓN:

Polvo humectable (WP)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % en Peso

INGREDIENTE ACTIVO:

Tiofanato de metilo:

4,4'-(o-fenilen)bis(3-tioalofanato) de dimetilo.....70.0
Equivalente a 700 g/kg de i.a.

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, agente humectante, absorbente
y vehículo.....30.0

TOTAL.....100.0

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Berenjena, chile y jitomate.

DOSIS

0.75 – 1.5 kg/ha dependiendo
del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Berenjena Chile Jitomate (14)	Marchitez (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.75-1.5 kg/ha
OBSERVACIONES	Realizar tres aplicaciones, la primera en pre-trasplante mediante inmersión de charolas durante 15 minutos, volumen de aplicación 600 L de agua/ha; y dos adicionales en post-trasplante, en drench, al cuello de la planta, a intervalo de 15 días, volumen de aplicación 20 mL de la mezcla/planta.	

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas.

() **Intervalo de Seguridad** en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CONTRAINDICACIONES

Evitar el uso continuado sin rotación con fungicidas de diferente modo de acción para evitar la resistencia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Seguir las recomendaciones de dosificación y aplicación para optimizar la efectividad y minimizar el riesgo de resistencia.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación, dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de ingestión puede causar vómito, diarrea; en caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación de la piel y ojos; en caso de inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio, debilidad y mareo.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, tratar sintomáticamente.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.