

FICHA TÉCNICA

S-MASPOR

Registro No: RSCO-HEDE-0237-X0211-009-86.9

DESCRIPCIÓN

Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en las plantas de maleza, impidiendo su crecimiento desde las primeras etapas.

MODO DE ACCIÓN

Herbicida de post-emergencia.

FORMA DE PREPARACIÓN

Durante el manejo y aplicación de este producto, utilice equipo de protección personal adecuado incluyendo overol de algodón, lentes de seguridad para manejo de productos químicos con protección hermética, guantes resistentes para manejo de productos químicos (neopreno), botas de neopreno y mascarilla con respirador. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia, agregue la dosis a emplear de **S-MASPOR** e inicie la agitación. Complete con agua la capacidad del tanque y continúe con la agitación. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice 420 litros de agua por hectárea.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Proporciona una barrera efectiva contra malezas, manteniendo los cultivos libres de competencia por recursos, lo que mejora su desarrollo y rendimiento.

USESE EN EL CULTIVO

RECOMENDADO: Maíz.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

S-metolaclor

GRUPO QUÍMICO:

Cloroacetamida

USO AGRONÓMICO:

Herbicida recomendado para el control preventivo de gramíneas y malezas de hoja ancha en una variedad de cultivos.

FORMULACIÓN:

Concentrado emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
Ingrediente Activo:	
S-METOLACLOR:	
Mezcla de (aRS,1S)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)acet-o-toluidida y (aRS,1R)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)acet-o-toluidida.....	
	86.9% (Equivalente a 960 g de i.a./L a 20°C)
Ingredientes Inertes:	
Emulsificantes y solvente.....	13.1%
TOTAL.....	100.0%

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

DOSIS

1.0 – 1.3 L/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ ha)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
Maíz (Sin límite)*	Cadillo Pata de gallina Pasto inglés Zacate gigante Quintonil Aceitillo Verdolaga	<i>Cenchrus pauciflorus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Lolium multiflorum</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Portulaca oleracea</i>	1.0 – 1.3	Realizar una aplicación en post-emergencia temprana a la maleza y post-emergencia al cultivo; volumen de aplicación 180 – 280 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas

(*) **Intervalo de seguridad**, en días, que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en cultivos jóvenes o en suelos muy arenosos donde el herbicida puede no ser efectivo. No aplicar con vientos mayores de 10 km/hr, ni cuando esté próximo a llover.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Aplicar con precaución en condiciones de poco viento para evitar la deriva a cultivos no objetivo. Utilizar ropa de protección adecuada.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación, dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: La ingestión en grandes cantidades puede causar alteraciones en el conteo de glóbulos rojos y/o anemia; Por vía dérmica: Irritación, enrojecimiento e hinchazón; Por vía inhalatoria: Dificultad para respirar, tos e irritación del tracto respiratorio.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, tratar sintomáticamente.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE COMO TIERRA O ARCILLA, COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVE AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.