

FICHA TÉCNICA

TRINEXA TERRUM

Registro No: RSCO-370/X/22

DESCRIPCIÓN

TRINEXA TERRUM® es un regulador del crecimiento vegetal sintético, su principal función es controlar el crecimiento vigoroso de las plantas al inhibir la biosíntesis de giberelinas, hormonas que promueven la elongación celular. Al reducir el contenido de giberelinas ayuda a prevenir el acame, que es la caída de las plantas debido a la falta de soporte estructural.

MODO DE ACCIÓN

TRINEXA TERRUM® actúa inhibiendo la formación de giberelinas, lo que resulta en tallos más cortos y gruesos. Esto mejora la resistencia mecánica de las plantas, haciéndolas menos susceptibles a daños por viento o lluvia intensa.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Al prevenir el acame, **TRINEXA TERRUM®** contribuye a un mejor desarrollo radicular y un aumento en la concentración de sacarosa en cultivos como la caña de azúcar. También puede aumentar los rendimientos de los cultivos al mejorar la estabilidad y resistencia de las plantas.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Cebada, trigo y caña de azúcar.

DOSIS

600 - 800 mL/ha o 1.0 - 1.5 L/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Trinexapac-etil

GRUPO QUÍMICO:

Ciclohexadionas

USO AGRONÓMICO:

Regulador de crecimiento tipo 2

FORMULACIÓN:

Concentrado emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA % en Peso

Trinexapac-etil

etil (RS)-4-ciclopropil(hidroximetil)-3,5-dioxociclohexanocarboxilato.....25.45

(Equivalente a 250 g de i.a./L)

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	DOSIS	INDICACIONES
Cebada Trigo	600-800 mL/ha	Realizar dos aplicaciones por vía foliar durante el desarrollo vegetativo al momento del amacollamiento.
Caña de azúcar	1.0 – 1.5 L/ha	Realizar una aplicación foliar 7 semanas antes de la cosecha.

FORMA DE PREPARACIÓN

Para abrir el producto deberá usar el equipo de protección personal indicado en la sección de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”, retirar el sello de seguridad y abrir el empaque, medir la cantidad de producto con una probeta graduada de plástico de acuerdo a la dosis recomendada y diluya en agua vertiendo la dosis previamente medida. Recomendando lo siguiente al momento de llenar el tanque de aspersión:

- 1) Agregue agua hasta la mitad del tanque de aspersión.
- 2) Agregue la cantidad de producto necesario.
- 3) Complemente con el agua necesaria, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de manera inmediata.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo de este producto, use el equipo de protección personal adecuado: overol de algodón, botas de neopreno, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con respirador y guantes resistentes a químicos. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Después de la jornada laboral se deberá lavar con detergente el equipo de protección por separado de la ropa de uso común y almacenar bajo llave en un área fresca del lugar trabajo bajo llave.

TRATAMIENTO MÉDICO

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente: **Inhalación:** Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). **Contacto con los ojos:** Enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, En caso de portar lentes de contacto, de ser posible retirarlos antes de enjuagar los ojos. Si persiste irritación, dolor, hinchazón, lagrimeo o sensibilidad a la luz, acuda con el oftalmólogo de inmediato. **Contacto con la piel:** Quite al paciente la ropa contaminada, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos para retirar el producto (utilizando guantes). Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Si fue ingerido: Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Consulte al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico para **TRINEXA TERRUM®**, por lo que, en caso de intoxicación, deberá aplicar tratamiento sintomático y vigilar signos vitales.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número 800 000 2869 (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD".

"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS".

"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA".

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA".

"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO".

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.